

مطالعه اشکال و رسوبات بستر تنگه خوران (لافت-پهل)، شرق خلیج فارس

رضا بهبهانی، کارشناس ارشد رسوب شناسی، سازمان زمین شناسی کشور*

غلامرضا حسین یار، کارشناس ارشد رسوب شناسی، سازمان زمین شناسی کشور

راضیه لک، استادیار، سازمان زمین شناسی کشور

احمد قرائی، کارشناس ارشد، سازمان زمین شناسی کشور

محمدرضا انسانی، کارشناس، سازمان زمین شناسی کشور

ساناز چایچی زاده، کارشناس ارشد ژئوفیزیک، سازمان زمین شناسی کشور

چکیده

در این پژوهش سعی شده است محدوده ای به وسعت حدود ۲۰ کیلومتر مربع واقع در تنگه خوران (محدوده بین بندر لافت و بندر پهل در استان هرمزگان) مورد مطالعه ژئوفیزیکی کم عمق و رسوب شناسی قرار گرفته تا اطلاعاتی در زمینه اشکال بستر در این منطقه بدست آید.

بر اساس مطالعات انجام شده، اشکال بستر در این منطقه شامل دونه های ساده بزرگ مد غالب با طول موج بین ۱۰ تا ۱۰۰ متر، دونه های مرکب متوسط تا بسیار بزرگ مد غالب با طول موج بین ۵ تا ۱۰۰ متر، دونه های ساده - مرکب بزرگ تا بسیار بزرگ جزر غالب با طول موج بین ۳۰ تا بیش از ۱۰۰ متر و دونه های ساده متوسط تا بسیار بزرگ جزر غالب می باشد. بیشترین طول موج مشاهده شده در منطقه مربوط به دونه های مرکب بزرگ تا بسیار بزرگ با مقدار ۳۰۰ متر و ارتفاع ۱۰ متر می باشد که اشکال بستر کوچکتر با طول موج ۲۰ تا ۳۰ متر بر روی بخش با شیب کم آن ها، تشکیل شده است. در جریان های تشکیل دهنده دونه ها (رژیم جریانی پایین) در این منطقه سرعت جریان و انتقال رسوبات از بخش فرورفته تا خط الراس افزایش می یابد و رژیم حرکتی دونه ها به سمت پایین دست جریان می باشد. بر اساس مطالعات دانه سنجی و مرفوسکوپی، رسوبات تشکیل دهنده اشکال بستر عمدتاً از ذرات درشت در محدوده ماسه متوسط تا گرانول (۲ تا ۲-Ø) تشکیل شده است (دامنه اندازه رسوبات تشکیل دهنده در منطقه مورد مطالعه از رس تا گرانول می باشد). ترکیبات آن ها شامل اجزای گراولی - سیلتی بیوکلاستیک با اجزای تخریبی (کوارتز در اندازه سیلت - ماسه ریز، خرده سنگ در اندازه گرانول - سیلت و میکا) می باشد.

واژه های کلیدی: تنگه خوران، اشکال بستر، دونه، رسوب و دانه سنجی.

مقدمه

جزیره قشم با مساحتی بالغ بر ۱۵۳۶ کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس به لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر کشتی رانی بین المللی و دارا بودن سواحل عمیق و امکانات بالقوه جهت تبدیل شدن به یک مرکز تولید و تجاری منطقه ای دارای امتیازات و برتری های ویژه ای می باشد (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ۱۳۸۲). تنگه لافت - پهل (تنگه خوران) در ناحیه جنوب ایران در بین طولهای ۵۰° ۴۲' تا ۵۵° ۴۶' ۴۶' شرقی و عرض های ۲۶° ۵۶' ۲۵' تا ۲۶° ۵۸' ۳۶' شمالی جغرافیایی قرار دارد. این منطقه از نظر تقسیمات کشوری در جنوب غرب استان هرمزگان و در ۷۰ کیلومتری جنوب غرب شهرستان بندر عباس واقع می باشد (شکل ۱). تغییرات سطح آب دریا در فاصله دو جزر و مد شبانه روزی در کرانه های اطراف جزیره قشم بین ۲/۱ تا ۳/۸ متر و در مواردی بیشتر (حدود ۵ متر) بوده و میزان آن بستگی به مورفولوژی محل و زمان های متفاوت در کهکشندهای عادی و حداقل (Neap tide) تا مهکشندهای بهاری / نجومی (Astronomical / Spring tide) دارد. از نظر مکانی تغییرات فوق در مناطق شمالی و شرقی جزیره نسبت به مناطق جنوبی و غربی بیشتر می باشد (مهندسین مشاور سکو ۱۳۷۴). در کرانه شمالی از بخش مرکزی جزیره قشم و در محدوده بین لافت - پهل (تنگه خوران)، بالاترین تفاوت سطح آب دریا در جزر و مد منطقه وجود داشته که این تغییرات تا حدود ۵ متر می رسد (مزو تا ماکروتایدال) (مشاهدات محلی و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ۱۳۸۲). در مناطق شمالی جزیره قشم در تنگه خوران، امواج به ندرت از ارتفاع یک متر تجاوز نموده و زمان تناوب آنها هم معمولاً کمتر از ۵ ثانیه است (بر اساس مشاهدات محلی و گفته های ماهیگیران محلی).

جریان های دریایی در منطقه مورد مطالعه عمدتاً ناشی از جزر و مدهای شبانه روزی (Tidal stream) و بندرت متاثر از طوفان ها می باشد (آروین و همکاران، ۱۳۸۹؛ مشاهدات محلی). در تنگه خوران بر اساس مشاهدات محلی، جریان های جزر و مدی نسبتاً شدیدی با توجه به موقعیت و مورفولوژی آن وجود دارد. در مواردی تغییرات در این جریان می تواند متاثر از جریان های رودخانه ای به ویژه در مواقع سیلابی رودخانه های کل و مهران از سرزمین مادر باشد (مهندسین مشاور سکو ۱۳۷۴). جهت کلی جریان در زمان مد از طرف دریای آزاد و کرانه های شرقی به طرف باختر و به سوی تنگه خوران بوده و در مواقع جزر تقریباً جهت جریان برای این بخش از تنگه برعکس می گردد (مهندسین مشاور سکو ۱۳۷۴؛ مشاهدات محلی). تغییر جهت جریان در رفت و برگشت کاملاً در روند خط مستقیم و یا ۱۸۰ درجه نسبت به هم نبوده و طبیعتاً تغییرات آن متاثر از مورفولوژی محلی می باشد (مشاهدات محلی).


جریان های دریایی از یک طرف باعث جابجایی رسوبات رودخانه ای وارده به دریا از رودخانه های منتهی به این تنگه (نظیر نهشته های رودخانه های کل و مهران) می شود و از طرف دیگر با توجه به ویژگی های نهشته های بستر و فیزیوگرافی آن، مسائل مربوط به فرسایش، رسوبخیزی و ایجاد اشکال بستر را باعث می گردد (مشاهدات محلی).

سرعت جریان های جزر و مدی در نقاطی از تنگه خوران برای اعماق ۵ متری آب دریا توسط گروه آب نگاری سازمان نقشه برداری اندازه گیری شده است. در برخی نقاط کرانه های نزدیک بندر پهل (خط های ۵۲، ۵۴ و ۵۶) با محدوده طول های ۵۵ درجه و ۴۶ دقیقه تا ۵۵ درجه و ۴۳ دقیقه شرقی و محدوده عرض های ۲۶ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۲۶ درجه و ۵۷ دقیقه شمالی، سرعت جریان مد و جزر در زمان کهکشند مساوی و معادل

کیلومتر بر ساعت (۰/۵۳ تا ۰/۵ متر بر ثانیه) و در زمان مهکشند به ترتیب ۴ و ۴/۲ کیلومتر بر ساعت (حدود ۱/۱۷ تا ۱/۱۱ متر بر ثانیه) اندازه گیری شده است. همچنین بر اساس محاسبات آروین و همکاران (۱۳۸۹) سرعت جریان در کانال تنگه (بخش مرکزی) حداکثر ۱/۴ متر بر ثانیه محاسبه شده است.

۱/۸ کیلومتر بر ساعت (۰/۵ متر بر ثانیه) و در زمان مهکشند به ترتیب ۴ و ۳/۹ کیلومتر بر ساعت (حدود ۱/۱۱ و ۱/۰۱ متر بر ثانیه) اندازه گیری شده است. در برخی نقاط کرانه‌های جنوبی مطالعه شده نزدیک لافت کهنه (خط‌های ۴۲ و ۴۴) حداکثر مقادیر سرعت جریان به ترتیب برای جزر و مد در زمان کهکشند ۱/۹ و ۱/۸

شکل ۱- موقعیت جغرافیایی خط‌های برداشت شده منطقه مورد مطالعه.



سازمان زمین شناسی کشور با طول ۱۵ متر و عرض ۵ متر مجهز به امکانات ناوبری و هیدروگرافی تخصصی شامل مکانیاب DGPS از نوع MAX در این برداشتها مورد استفاده قرار گرفت. نرم‌افزار Hypack در برداشتهای لرزه‌نگاری به منظور تعیین مسیر برداشت و ناوبری بکار گرفته شد. بازه مورد استفاده در این دستگاه بین KHZ ۱۵-۲ متغیر است. در این سری از داده‌ها اغلب از فرکانس KHZ ۵ استفاده گردیده است. دقت اسمی (قدرت تفکیک) این دستگاه کمتر از ۱۰ سانتی‌متر در جهت عمودی بوده و برداشت با فرکانس غالب ۵KHZ، تفکیک پذیری ۱۰-۱۵ سانتی‌متر را در ۵ متر اول تضمین می‌نماید. عمق نفوذ برداشت تا حداکثر ۵۰

مواد و روش‌ها

جهت مطالعه ویژگی‌های بستر تنگه لافت- پهل (محدوده‌ای به وسعت ۲۰ کیلومتر مربع)، از داده‌های لرزه‌نگاری کم عمق با قدرت تفکیک بالا، که توسط دستگاه Sub-Bottom Profiler مدل SES-2000 Standard ساخت شرکت Innomar برداشت گردیده، استفاده شده است. این دستگاه بر اساس روش آکوستیک پارامتریک کار می‌کند (Muller et al. 2001). در این روش، به دلیل استفاده از دو فرکانس نزدیک به هم و نوع خاص ترکیب آنها از اثرات نامطلوب رایج در دیگر دستگاههای آکوستیک موجود تا حد امکان کاسته شده است. شناور ساحلی زمین دریا متعلق به

(2009; After Nichols 1974) استفاده شده است. در ضمن اشکال بستر بر اساس طبقه بندی آنتونی و لت (Anthony and Leth 2002) که ترکیبی از طبقه بندی آلن (Allen 1984) و اشلی (Ashley 1990) می باشد، رده بندی شده است.

موقعیت زمین شناسی و تکتونیک

موقعیت زمین شناسی خلیج فارس به طور خلاصه نتیجه تجمع پیوسته رسوبات از زمان پالئوزوئیک به بعد است (Stampfli et al. 1991). از طرفی ساختار امروزی این ناحیه نتیجه فرایندهای تکتونیکی عمده ای است که در زمان ترشیاری پسین رخ داده است (Ziegler 2001). منطقه قشم بخشی از حاشیه جنوب شرقی زون زاگرس می باشد. زون زاگرس و بخش مورد بررسی از آن در زون همگرایی و برخورد پوسته قاره ای عربستان با پوسته قاره ای ایران قرار داشته و نهشته ها در حوضه زاگرس، علاوه بر رسوبات تبخیری سری هرمز، عمدتاً شامل رسوبات دریائی پلاتفرمی پالئوزوئیک، رسوبات دریائی مزوزوئیک - ترشیاری و بالاخره نهشته های دریائی کم عمق و کولابی تا قاره ای مربوط به اواخر ترشیاری و کواترنر که با کم شدن عمق حوضه و خروج از آب منطقه حاصل شده است، می باشد (Bahroudi and Koyi 2003; Alavi 2004 and 2007). رسوبات نهشته شده در حوضه رسوبی زاگرس در فاز تکتونیکی آلپی اواخر ترشیاری و در ادامه آن چین خوردگی پیدا نموده و ساختارهای زمین شناسی، شکستگی ها و راندگی های اصلی را با روند شمال غرب - جنوب شرق ایجاد کرده است که مهمترین زون زمین شناسی حاوی منابع انرژی فسیلی را در ایران تشکیل داده است. در بخش شمالی این زون، چین خوردگی های شدید و راندگی ها، بخش نسبتاً برآمده

متر رسوبات نرم در شرایط ایده آل می باشد. جهت پردازش و آماده سازی داده ها از نرم افزار ISE 2.92.16 استفاده شده است. تهیه نقشه کار و پلات خطوط برداشت نیز با استفاده از نرم افزار Arc GIS 9.2 انجام گرفته است. در ضمن برای تصویربرداری از اشکال بستر (در خطهای مورب) از دستگاه Side Scan Sonar ساخت شرکت EdgeTech مدل (4300-MPX) استفاده شده است. به منظور برداشت خطوط لرزه نگاری (برداشت اطلاعات در گشت دریایی گروه ژئوفیزیک مدیریت زمین شناسی دریایی سازمان زمین شناسی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ انجام شده است)، شبکه منظم مربع مستطیل شامل ۳۲ خط (۲۲ خط در راستای تقریباً شمالی - جنوبی و ۱۰ خط در راستای تقریباً شرقی - غربی) به فاصله ۳۰۰ متر طراحی و در مجموع نزدیک به ۱۱۰ کیلومتر خطی مورد پیمایش قرار گرفت. البته در دو مورد از پیمایش ها این فاصله به ۱۵۰ متر و در یک مورد نیز به ۶۰۰ متر رسیده است (شکل ۱).

همچنین ۱۹ نمونه از رسوبات بستر بوسیله نمونه بردار رسوب بستر دریا برداشته شد و مورد دانه بندی، مورفوسکوپی و تعیین پارامترهای آماری رسوب شناسی از قبیل میانه، میانگین، جورشدگی (انحراف جامع) ترسیمی جامع، کج شدگی ترسیمی جامع و کشیدگی قرار گرفتند. دانه بندی ذرات به روش تر توسط الک شیکر مدل فریتچ و دانه بندی ذرات کوچکتر از ۶۳ میکرون توسط دستگاه لیزر پارتیکل سایزر در آزمایشگاه رسوب شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی انجام گردید. همچنین رسوبات دانه بندی شده توسط میکروسکوپ مورد مطالعه قرار گرفتند. در ضمن جهت بررسی گرد شدگی دانه های رسوبی از نمودار پتی جان (Pettijohn et al. 1987) و جهت نامگذاری رسوبات از نمودار فولک (Folk

در ارتباط با ایجاد دونه‌ها ذکر شده است (Ashworth et al. 2000; Best 1996 and 2005). فرم اشکال بستر به طور اساسی بستگی به تعادل میان بار بستر و بار معلق دارد (Prothero and Schwab 2003). با کاهش بار معلق، اشکال بستر پرسیب‌تر ایجاد می‌شود و با افزایش بار معلق، زاویه بخش پر شیب کمتر می‌گردد. تأثیرات شکل و جور شدگی ذرات برای ایجاد اشکال بستر کاملاً "شناخته شده نیستند" (Ashworth et al. 2000). دونه‌ها از اشکال بستری هستند که معمولاً "توسط جریان‌های آبی یک جهتی تشکیل می‌شوند. تشکیل این اشکال به سرعت جریان، عمق جریان و اندازه‌های رسوب بستگی دارد (Allen 1984). این اشکال در رودخانه‌ها، خلیج‌های دهانه‌ای، پهنه‌های جزر و مدی، کانال‌های دلتایی، در طول خطوط ساحلی و در قسمت‌های کم عمق (شلف‌های با جریان‌ات جزر و مدی قوی) و عمیق دریا تشکیل می‌شوند. تشکیل دونه‌های آبی بستگی به اعماق آب دارد (Nichols 2009). دونه‌ها در ماسه‌های ریز - بسیار درشت و گراول ایجاد می‌شود اما در ماسه‌های بسیار ریز یافت نمی‌شوند (Nichols 2009). دونه‌های گراولی زیر آبی، عوارض معمولی در محیط‌های دریایی تحت تأثیر توفان و در رژیم‌های مزو تا ماکرو تایدال می‌باشد (Carling 1999; Flemming 2000). دونه‌های گراولی معمولاً "در مناطقی با بار رسوبی قاره‌ای کم تا متوسط و شرایط نسبتاً "پرانرژی تشکیل می‌شود (Anthony and Leth 2002; Cirac et al. 2000). به طور کلی اشکال بستر بزرگ در محیط‌های رسوبی مدرن ماسه‌ای از قبیل شلف‌های آواری، کربناته و پلت فرم‌های اپی کانننتال {عمق آب بیش از ۱ متر، اندازه ذرات بزرگتر از ۰/۱۵ میلی‌متر (ماسه بسیار ریز) و میانگین سرعت جریان آب بین ۰/۴ تا ۱/۵ متر/ثانیه} که تحت تأثیر جریان‌های قوی، آشفته‌گی‌های توفانی و یا جریان‌های جزر و مدی

زاگرس را تشکیل داده که بطرف جنوب و تا خلیج فارس به مناطق عمدتاً چین خورده با شرایط تکنونیکي ملایم تر و توپوگرافی عمومی دارای ارتفاع پائین تر می‌رسد (Bahroudi and Koyi 2003). بر اساس منحنی سطح ائوستاتیک دریا، افت شدید کوتاه مدتی در طول پلیستوسن - هولوسن اتفاق افتاده است (Haq et al. 1988). بطوریکه به غیر از نواحی خلیج فارس (که در آن سازند آغا‌جاری تشکیل شده)، سایر قسمت‌های پلیت عربی از آب بیرون آمده است. برخورد قاره‌ای - قاره‌ای بین پلیت عربی و اوراسیا در طول این دوره نیز ادامه داشته و منجر به تشکیل و دگرذیسی بخش جلویی زاگرس شده است و کوهزایی زاگرس تشدید شده است (Ziegler 2001). در اواخر پلیوسن سطح آب دریا در حدود ۱۵۰ متر بالاتر از وضعیت کنونی بوده است (Haq et al. 1988). در دوره یخچالی پلیستوسن پسین، بخشی از خلیج فارس رخنمون یافته است. پس از این پایین افتادگی، سطح آب شروع به بالا آمدگی کرده و به وضعیت کنونی نزدیکتر شده است. در آغاز این دوره شیل‌های کم عمق دریایی آغا‌جاری رسوب کرده است ولی با افزایش دما و حاکم شدن آب و هوای گرم، محیط کربناته در بخش جنوبی خلیج فارس توسعه یافته است (Ziegler 2001).

پارامترهای موثر بر تشکیل اشکال بستر

پارامترهای متعددی نظیر سرعت جریان، عمق جریان، دمای جریان (کنترل کننده چگالی و ویسکوزیته سیال)، اندازه ذرات، چگالی ذرات، جور شدگی، میزان آشفته‌گی بزرگ مقیاس و شکل ذرات بر گسترش اشکال بستر دخالت دارند (Southard and Boguchwal 1990; Best 2005). اهمیت آشفته‌گی‌های با مقیاس بزرگ بوسیله بسیاری از محققین

است، مشاهده می شود (Ashley 1990). اشکال بستر بزرگ دوام و قدرت نسبی جریان غالب و در برخی موارد تغییر شکل امواج را منعکس می کند. به دلیل حجم بیشتر رسوبات انباشته شده در اشکال بستر بزرگ نسبت به انواع کوچکتر آن، این اشکال می توانند در محدوده زمانی متفاوتی (ماه ها تا سال ها) نسبتاً ثابت باشند در حالی که اشکال کوچکتر حتی در اثر نوسانات جزر و مد بهاری - حداقل (Spring-neap) بی ثبات تر هستند (Harris and Collins 1985; Devon et al. 2004) گر چه جریان های جزر و مدی در دریای با اهمیت کمتری نسبت به امواج، طوفان و جریان های دریایی دارند، اما در خلیج های دهانه ای، تنگه ها و سایر قسمت های باریک جریان های تند و سریعی به وجود می آورند (Nichols 2009). این جریان ها می تواند تا عمق ۱۰۰ متر از بستر دریا را تحت تاثیر قرار دهد و به مقدار کافی قدرت دارد تا مقادیر زیادی از ذرات ماسه - ای را در محیط های دریایی کم عمق حرکت دهد (Lobo et al. 2000; Lo Icono and Guillen 2008; Nichols 2009).

اشکال بستر و توصیف رسوبات تشکیل دهنده آن در تنگه خوران

بر اساس طبقه بندی آنتونی و لت (۲۰۰۲)، اشکال بستر در این منطقه شامل دون های ساده بزرگ مد غالب (Flood dominated) با طول موج بین ۱۰ تا ۱۰۰ متر (خط های ۴۴، ۴۶، ۵۰، ۵۲، ۵۴ و ۵۶)، دون های مرکب متوسط تا بسیار بزرگ مد غالب با طول موج بین ۵ تا ۱۰۰ متر (خط های ۴۲، ۴۶، ۵۴)، دون های ساده - مرکب بزرگ تا بسیار بزرگ جزر غالب (Ebb


dominated) با طول موج بین ۳۰ تا بیش از ۱۰۰ متر (خط ۵۲) و دون های ساده متوسط تا بسیار بزرگ جزر غالب (خط های ۴۲ و ۵۶) می باشد (شکل های ۲ تا ۵) (جدول ۱). بیشترین طول موج مشاهده شده در منطقه مربوط به دون های مرکب بزرگ تا بسیار بزرگ با مقدار ۳۰۰ متر و ارتفاع ۱۰ متر می باشد که اشکال بستر کوچکتر با طول موج ۲۰ تا ۳۰ متر بر روی بخش با شیب کم آن ها، تشکیل شده است (شکل ۵). لازم به ذکر است که در خط های مطالعه شده نظیر خط ۴۶ دون ها با طول موج و ارتفاع گوناگونی مشاهده شده اند (شکل ۳). در جریان های تشکیل دهنده دون ها (رژیم جریانی پایین) در منطقه مورد مطالعه سرعت جریان و انتقال رسوبات از بخش فرورفته تا خط الراس افزایش می یابد و رژیم حرکتی دون ها به سمت پایین دست جریان (Downstream) می باشد (شکل های ۴ و ۵). میزان زاویه بخش پر شیب دون ها مشاهده شده در برخی نقاط (عموماً کمتر از 10°) نشان دهنده حاکم بودن جریان جزر و مدی تقریباً متقارن (نزدیک بودن سرعت جریان های جزر و مدی) می باشد. این نتایج توسط برخی پژوهشگران نیز بیان شده است (Stride 1982; Harris et al. 1986; Bloom and Parker 2004). ایجاد اشکال بستر مرکب (در بخش با شیب کم و یا بخش فرورفته دون ها در خط های ۴۲، ۴۶، ۵۲ و ۵۴) در منطقه مورد مطالعه احتمالاً در اثر بالا آمدن جریان های دوار آب (Eddy) می باشد. البته لازم به ذکر است در محیط های جزر و مدی مانند تنگه خوران، اشکال بستر روی هم قرار گرفته می توانند در اثر تغییر عمق و یا تغییر شدت جریان نیز ایجاد شوند (Nichols 2009).

جدول ۱- رده بندی و توصیف اشکال بستر مشاهده شده در نیمرخ های طولی منطقه مورد مطالعه.

Profile No.	Water depth (m)	Spacing (Wave length) (m)	Height (m)	Angel (°) and length (m) of lee side	Angel (°) and length (m) of stoss side	Discription
56	3-4	45-50	0.6-0.9	A=12.5, L=5.0-7.5	A=2.3, L=40.0-42.5	Simple large flood dominated dune
56	14-19	5-80	0.2-2.5	A=7.3-8.6, L=1.5-30	A=4.3-6.0, L=3.5-50.0	Simple medium - large ebb dominated dune.
56	14-19	110	1.7-4.5	A=6.9-8.0, L=16.0-23.0	A=3.5-4.8, L=87.0-94.0	Simple very large ebb dominated dune.
54	9-11	17-25	0.3-1.0	A=4.8-10.0, L=3.5-8.0	A=1.4-7.0, L=13.5-17.0	Simple large flood dominated dune.
54	32-34	40-85	1.6-3.5	A=6.4, L=12.0-23.0	A=2.7, L=28.0-64.0	Composite large flood dominated dune. Smaller dunes overlay on the stoss side of the larger dune.
52	15	42	1-1.5	A=7.3, L=14.0	A=5.4, L=28.0-64.0	Simple large flood dominated dune.
52	24-43	30-300	1.6-11	A=4.6-12.6, L=10.0-80.0	A=2.5-5.0, L=20. 220	Simple- composite large to very large ebb dominated dune. Smaller bedform with 20 to 30 (m) spacing (large dune) overlay on the stoss side of larger bedform.
50	19-28	33-98	1.8-2.1	A=6-9.8.0, L=10.0-27.0	A=2.7-6.2, L=23.0-71.0	Simple large flood dominated dune.
46	12-28	27-95	1.2-5.0	A=6.0-19.0, L=11.0-25.0	A=4.3-10.3, L=16.0-70.0	Simple large flood dominated dune.
46	16-21	102	3.4	A=9.3, L=35.0	A=5.0, L=67.0	Composite very large flood dominated dune.
44	13-28	19-60	0.5-2.4	A=7.1-8.8, L=3.0-22.0	A=1.9-5.0, L=16.0-48.0	Simple large flood dominated dune.
42	22-24	80-90	0.7-2.4	A=4.5-7.0, L=15.0-20.0	A=3.4-6.5, L=65.0-70.0	Simple large ebb dominated dune.
42	19-24	5-110	1.5-2.5	A=7.6-9.7, L=2.0-10.0	A=3.2-8.7, L=3.0-100.0	Composite medium - very large flood dominated dune.




الف




ب


شکل ۲- موقعیت جغرافیایی (الف) و نیمرخ دون بزرگ مد غالب در خط طولی ۴۲ (ب). جهت جریان مد از شرق به غرب است. علامت پیکان مورب، نشاندهنده بخش با شیب تند می باشد.




الف



ب




د




ج


شکل ۳- موقعیت جغرافیایی (الف) و نیمرخ‌های بزرگ مد غالب در خط طولی ۴۶ (ب تا د).



الف




ب




ج

شکل ۴- موقعیت جغرافیایی (الف) و نیمرخ دون‌های بزرگ (ب) و بسیار بزرگ مرکب (ج) جزر غالب در خط طولی ۵۲. جهت جریان بوجود آورنده این اشکال بستر از غرب به شرق است. علامت پیکان مورب در شکل ج نشان‌دهنده اشکال بستر مرکب می‌باشد.



الف




ب


شکل ۵- موقعیت جغرافیایی (الف) و نیمرخ دون بسیار بزرگ مرکب جزر غالب (ب) در خط طولی ۵۲. جهت حرکت شکل بستر به سمت پایین دست جریان می باشد. طول موج آن ۳۰۰ و ارتفاع آن ۱۰ متر می باشد.

سینوسی و اشکال بستر دو شاخه مشاهده می شوند
(شکل های ۶ تا ۸).

بر اساس تصاویر گرفته شده از بستر دریا توسط دستگاه
Side Scan Sonar در تنگه خوران، اشکال بستر (دون)
دوبعدی با خط الراس مستقیم و سه بعدی با خط الراس




الف




ب

شکل ۶- موقعیت جغرافیایی (الف) و خط الراس مستقیم (ب) در خط مورب ۳۱۷ در منطقه مورد مطالعه. جهت جریان (Current direction; C.D.) عمود بر امتداد خط الراس اشکال بستر در راستای شرقی-غربی است.



الف



ب

شکل ۷- خط الراس سینوسی در خط مورب ۳۲۳ در منطقه مورد مطالعه. جهت جریان (Current) (direction; جهت جریانی). C.D. عمود بر امتداد خط الراس اشکال بستر در راستای شرقی-غربی است. الف) محل تصویربرداری از اشکال بستر در تنگه خوران و ب) نمای فوقانی از خط الراس های موجود می باشد.


با توجه به وجود این اشکال و خط الراس‌های متفاوت، جریان جزر و مدی حاکم بر منطقه در نقاط گوناگون از لحاظ شدت و قدرت با هم تفاوت دارند. اشکال بستر سه بعدی (خط الراس سینوسی) نسبت به دوبعدی (خط الراس مستقیم) شدت جریان بیشتری را نشان می‌دهند (Costello and Southard 1981; Ashley 1990; Boggs 2001). دون‌های دو بعدی نسبتاً "طویل، دارای ارتفاع کم و دون‌های سه بعدی (جریان‌های با سرعت بالاتر) دارای طول موج کمتر و ارتفاع بیشتری می‌باشند. حرکت رسوبات در دون‌های دوبعدی به صورت تماسی به سمت پایین دست جریان و در دون‌های سه بعدی به صورت جهشی، تماسی و متناوباً" به صورت بار بستر می‌باشند (Cheel 2005). با مطالعه تصاویر Side Scan profiler می‌توان جهت دقیق جریان جزر و مدی را تعیین کرد و فقط می‌توان راستای جریان را محاسبه کرد. اما با توجه به اطلاعات تکمیلی Sub-bottom profiler می‌توان جهت دقیق جریان را بدست آورد که در دون‌های مد غالب، جهت جریان غالب و تاثیر گذار بر اشکال بستر از شرق به غرب (بخش با شیب تند در دون‌های مد غالب مورد مطالعه) (شکل ۳) و در دون‌های جزر غالب برعکس آن (از غرب به شرق) (شکل

۵) می‌باشد. به طور کلی در منطقه مورد مطالعه اشکال بستر مد غالب نسبت به جزر غالب از فراوانی بیشتری برخوردارند. وجود خط الراس‌های دو شاخه (شبه به خط الراس‌های مرتبط با ریل‌های موجی) (شکل ۸) و زاویه شیب کمتر از ۱۰ درجه بخش پر شیب اشکال بستر در برخی نقاط مورد مطالعه، نشان دهنده جریان‌های جزر و مدی تقریباً "مقارن" (نزدیک بودن سرعت جریان‌های جزر و مدی) می‌باشد.

بر اساس مطالعات دانه سنجی و مرفوسکوپی، رسوبات تشکیل دهنده اشکال بستر عمدتاً از ذرات درشت در محدوده ماسه متوسط تا گرانول (۲ تا ۲۰-Ø) تشکیل شده است (دامنه اندازه رسوبات تشکیل دهنده در منطقه مورد مطالعه از رس تا گرانول می‌باشد). ترکیبات آن‌ها شامل اجزای گراولی - سیلتی - بیوکلاستیک با اجزای آواری (کوارتز در اندازه سیلت - ماسه ریز، خرده سنگ در اندازه گرانول - سیلت و میکا) می‌باشد. در تمام نمونه‌های مطالعه شده ذرات در اندازه ماسه متوسط و درشت فراوانترین اجزای تشکیل دهنده آن‌ها می‌باشند.



الف



ب

شکل ۸- خط الراس دو شاخه در خط مورب ۲۴۷. جهت جریان (Current direction; C.D.) عمود بر امتداد خط الراس اشکال بستر در راستای شرقی-غربی است. الف) محل تصویربرداری از اشکال بستر در تنگه خوران و ب) نمای فوقانی از خط الراس های دو شاخه می باشد.


همچنین در تمام نمونه‌های مطالعه شده، ذرات گلی (ذرات در اندازه سیلت و رس) به میزان اندک مشاهده شده است. بیشترین درصد ذرات گلی در نمونه LT-14 (خط ۵۰) با فراوانی ۸ درصد وزنی و کمترین میزان آن در نمونه LT-7 (خط ۷) با فراوانی ۰/۱۳ درصد وزنی می‌باشد. پارامترهای آماری از قبیل میانگین، میانگین، جورشدگی (انحراف معیار ترسیمی جامع)، کج‌شدگی ترسیمی جامع، کشیدگی و نوع رسوبات در منطقه مورد مطالعه، در جدول ۲ ذکر شده است. بر اساس این مطالعات، اشکال بستر از رسوبات با جورشدگی متوسط (در اکثر نمونه‌ها) تا بد (به علت همراهی ذرات ماسه ای، گراولی و گلی با یکدیگر در تعداد کمی از نمونه‌ها)، کج‌شدگی منفی (کج‌شدگی به سمت ذرات دانه درشت) تا نزدیک متقارن (به استثنای نمونه LT-14 که به دلیل وجود ۸ درصد وزنی ذرات گلی دارای کج‌شدگی مثبت می‌باشد) و میانگین اندازه ذرات ماسه متوسط و درشت (به استثنای نمونه LT-10 (خط ۵۰) که میانگین اندازه ذرات آن ماسه بسیار درشت می‌باشد) تشکیل شده است.

فراوانی ذرات در اندازه ماسه، جورشدگی متوسط اکثر رسوبات، کم بودن ذرات در اندازه سیلت و رس و وجود جریان جزر و مدی نسبتاً سریع در منطقه مورد مطالعه سبب ایجاد اشکال بستر گوناگون شده است. بر اساس مطالعات مورفوسکوپی صورت گرفته، این



رسوبات به ترتیب فراوانی از قطعات کربناته تخریبی، پوسته موجوداتی نظیر گاستروپودا و قطعات خار اکینودرم، خرده سنگ آهکی و بلورهای کوارتز و میکا تشکیل شده‌اند (شکل‌های ۹ و ۱۰). وجود خرده سنگ‌های آهکی عمدتاً نیمه گرد شده (شکل ۱۰) و فراوان بودن قطعات کربناته تخریبی که در واقع عمدتاً از پوسته موجوداتی تشکیل شده است که آثار حمل و فرسایش در آن‌ها به طور وضوح دیده می‌شود، نشان دهنده وجود یک جریان حمل کننده رسوبات در منطقه مورد مطالعه است. وجود اشکال بستر گوناگون نیز خود موید جریان‌های جزر و مدی نسبتاً سریع در تنگه خوران است. بلورهای کوارتز نیمه گرد شده- نیمه زاویه دار در اندازه ماسه ریز- سیلت احتمالاً دارای منشا رودخانه‌ای می‌باشند که توسط رودخانه‌های موجود در منطقه نظیر رودخانه کل تامین می‌شود. لازم به ذکر است که فقدان بلورهای درشت کوارتز (بزرگتر از ماسه ریز) احتمال تأثیر جریان‌های بادی را در انتقال آن‌ها به محیط رسوبی مورد مطالعه منتفی نمی‌کند و برای شناسایی دقیق منشا بادی یا آبی یا تأثیر هر دوی آن‌ها در منطقه، احتیاج به مطالعه و شناسایی دقیق بافت سطح بلورهای کوارتز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) می‌باشد. عملکرد باد در تامین بخشی از رسوبات خلیج فارس توسط برخی از محققین بیان شده است (Preusser et al. 2002)

جدول ۲- پارامترهای رسوب شناسی نهشته‌های تنگه خوران

Sample No.	Line No.	Sediment type	Mean (MZ)	Kurtosis	Median (MdØ)	Skewness (SKI)	Sorting (σI)
LT-1	44	Slightly gravelly sand	1.32	0.97 mesokurtic	1.26	0.02 Near symmetrical	0.73 Medium sorting
LT-2	42	Slightly gravelly sand	0.81	1.78 velyeptokurtic	0.94	-0.26 Coarse skewed	0.86 Medium sorting
LT- 3	42	Gravelly sand	0.25	1.19 leptokurtic	0.80	-0.53 Strongly coarse skewed	1.29 Bad sorting
LT- 4	52	Gravelly sand	0.42	1.61 Very leptokurtic	0.85	-0.48 Strongly coarse skewed	1.22 Bad sorting
LT- 5	52	Slightly gravelly sand	1.22	1.59 Very leptokurtic	1.19	0.01 Near symmetrical	0.87 Medium sorting
LT- 6	52	Gravelly sand	0.40	1.13 leptokurtic	0.67	-0.47 Strongly coarse skewed	1.05 Bad sorting
LT- 7	42	Gravelly sand	0.53	1.15 leptokurtic	0.75	-0.43 Strongly coarse skewed	0.94 Medium sorting
LT- 8	50	Gravelly sand	0.66	1.91 Very leptokurtic	0.88	-0.38 Strongly coarse skewed	1.05 Bad sorting
LT-9	50	Gravelly sand	0.39	1.04 mesokurtic	0.58	-0.39 Strongly coarse skewed	0.96 Medium sorting
LT- 10	46	Gravelly sand	-0.40	0.64	-0.29	-0.10	1.30
Sample No.	Line No.	Sediment type	Mean (MZ)	Kurtosis	Median (MdØ)	Skewness (SKI)	Sorting (σI)
LT- 11	42	Slightly gravelly sand	0.99	2.01 Very leptokurtic	0.99	-0.14 Coarse skewed	0.72 Medium sorting
LT- 12	46	Gravelly sand	0.16	0.88 platykurtic	0.59	-0.41 Strongly coarse skewed	1.30 Bad sorting
LT- 13	54	Slightly gravelly sand	1.47	0.73 platykurtic	1.47	0.002 near symmetrical	0.65 Medium - good sorting
LT- 14	50	Slightly gravelly sand	0.91	3.91 extremely leptokurtic	0.96	0.26 Fine skewed	1.38 Bad sorting
LT- 15	50	Slightly gravelly sand	0.86	1.75 Very leptokurtic	0.93	0.04 near symmetrical	0.83 Medium sorting
LT- 16	50	Gravelly sand	0.63	1.33 leptokurtic	0.75	-0.30 Strongly coarse skewed	0.90 Medium sorting
LT- 17	46	Slightly gravelly sand	0.44	0.92 mesokurtic	0.44	-0.09 near symmetrical	0.76 Medium sorting
S-1	46	Slightly gravelly sand	0.83	1.29 leptokurtic	0.90	-0.10 Coarse skewed	0.67 Medium-good sorting
S- 3	46	Slightly gravelly sand	0.41	1.03 mesokurtic	0.41	-0.13 Coarse skewed	0.82 Medium sorting



شکل ۹- قطعات کربناته تخریبی، پوسته موجودات، بیوتیت و کوارتز در نمونه‌های مطالعه شده. به نیمه زاویه دار- نیمه گرد بودن ذرات کوارتز توجه شود. نمونه LT-7 (الف) در خط ۴۲ (نزدیک ساحل لافت) و در عمق ۱۸ متری، نمونه LT-13 (ب) در خط ۵۴ (نزدیک ساحل پهل) و در عمق ۲۵ متری و نمونه LT-6 (ج) در خط ۵۲ (نزدیک ساحل پهل) و در عمق ۲۸ متری برداشت شده است.



شکل ۱۰- قطعات کربناته تخریبی، پوسته موجودات و خرده سنگ مشاهده شده در تنگه خوران. به میزان گردشگری خرده سنگ و قطعات کربناته توجه شود. نمونه LT-1 (الف) در خط ۴۴ (نزدیک ساحل لافت) و در عمق ۲۰ متری، نمونه S 3 (ب) در خط ۴۶ (تقریباً" در بخش مرکزی تنگه) و در عمق ۳۵ متری برداشت شده است.

نتیجه گیری

ذرات درشت در محدوده ماسه متوسط تا گرانول و دارای قطعات کربناته تخریبی فراوان به همراه پوسته موجودات، خرده سنگ، کوارتز و میکا به مقدار کمتر می باشد. وجود خرده سنگ های آهکی عمدتاً" نیمه گرد شده و فراوان بودن قطعات کربناته تخریبی که در واقع عمدتاً" از پوسته موجوداتی تشکیل شده است که

اشکال بستر مطالعه شده متشکل از دون های عمدتاً" ماسه ای (دامنه اندازه رسوبات تشکیل دهنده از رس تا گرانول می باشد) با طول موج های ۵ تا ۳۰۰ متر، ارتفاع ۰/۲ تا ۱۰ متر و زاویه بخش پرسیب ۳/۵ تا ۱۹ درجه می باشد. رسوبات تشکیل دهنده این اشکال عمدتاً" از

۳ - مهندسین مشاور سکو (با نظارت عبدالعظیم حقّی پور)، ۱۳۷۴، گزارش پژوهش‌های زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی قشم، ۵۲۲ ص.

4- Alavi, M., 2004, Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution: American Journal of Science, v. 304, p. 1-20.

5- Alavi, M., 2007, Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran: American Journal of Science, v. 307, p. 1064-1095.

6- Allen, J. R. L., 1984, Sedimentary structures: their character and physical basis, in Developments in sedimentology 30: Elsevier, Amsterdam, v. 1, 663p.

7- Anthony, D., and J. O. Leth, 2002, Large-scale bedforms, sediment distribution and sand mobility in the eastern North sea off the Danish west coast: Marine Geology, v. 182, p. 247-263.

8- Ashley, G. M., 1990, Classification of large-scale subaqueous bedforms: a new look at an old problem: Journal of Sedimentary Petrology, v. 60, p. 160-172.

9- Ashworth, P. J., J. Best, J. Rodon, C. S. Bristow, and G. J. Klaassen, 2000, Morphological evolution and dynamics of a large, sand braid-bar, Jamuna River, Bangladesh: Sedimentology, v. 47, p. 533-555.

10- Bahroudi, A., and H. A. Koyi, 2003, Effect of spatial distribution of Hormuz on deformation style in the Zagros fold and thrust in the Zagros belt, analogue modeling approach: Journal of Geological Society of London, v. 160, p. 719-733.

11- Best, J., 1996, The fluid dynamics of small-scale alluvial bedforms. In: P. A. Carling, and M. D. Dawson (Eds.), Advances in fluvial dynamics and stratigraphy: Wiley, Chechester, p. 67-125.

12- Best, J., 2005, Kinematics, topology and significance of dune-related macroturbulence: some observations from the laboratory and field. In: M. D. Blum et al. (Eds.), Fluvial Sedimentology VII: Special Publication, International Association of Sedimentologist, v. 35, p. 41-60.

13- Bloom, A., and G. Parker, 2004, Vertical sorting and the morphodynamics of bedform dominated rivers: A modeling framework: Journal of Geophysical Research, v. 109, p. 1-15.

آثار حمل و فرسایش در آن‌ها به طور وضوح دیده می‌شود، نشان دهنده وجود یک جریان حمل‌کننده رسوبات در منطقه مورد مطالعه است. فراوانی ذرات در اندازه ماسه، جور شدگی متوسط اکثر رسوبات، کم بودن ذرات در اندازه سیلت و رس و وجود جریان جزر و مدی نسبتاً "سریع در منطقه مورد مطالعه سبب ایجاد اشکال بستر گوناگون شده است. بر اساس طبقه‌بندی صورت گرفته، اشکال بستر در تنگه خوران شامل دون-های متوسط تا بسیار بزرگ مرکب و ساده جزر و مد غالب می‌باشد. وجود دون‌ها نشان دهنده وجود رژیم-های جریانی پایین در نقاط مورد مطالعه می‌باشد. میزان زاویه بخش پر شیب دون‌های مطالعه شده (عموماً) کمتر از ۱۰ درجه) نشان دهنده حاکم بودن جریان‌های جزر و مدی تقریباً "متقارن (نزدیک بودن سرعت جریان‌های جزر و مدی) در برخی نقاط مورد مطالعه می‌باشد. ایجاد اشکال بستر مرکب احتمالاً "در اثر بالا آمدن جریان‌های دوار آب یا در اثر تغییر عمق و شدت جریان می‌باشد. در ضمن این اشکال به صورت‌های دو بعدی با خط‌الراس مستقیم، سه بعدی با خط‌الراس سینوسی و دو شاخه مشاهده شده‌اند. وجود این اشکال و خط‌الراس‌های گوناگون، نشان دهنده متفاوت بودن شدت و قدرت جریان جزر و مدی در نقاط مورد مطالعه است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در تنگه خوران، اشکال بستر مد غالب نسبت به جزر غالب از فراوانی بیشتری برخوردارند.

منابع

- ۱ - آروین، ع.، ا. صادقی، و م. تجزیه چّی، ۱۳۸۹، بررسی عددی جریانات جزر و مدی در کانال قشم: نهمین همایش بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، ۱۱ ص.
- ۲ - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۲، جغرافیای جزایر ایرانی خلیج فارس (قشم، لارک، هرمز و هنگام)، ۶۲۷ ص.

- 25- Harris, P. T., G. M. Ashley, M. B. Collins, and A. E. James, 1986, Topographic features of the Bristol channel sea-bed: a comparison of SEASAT and side-scan sonar images: *International Journal of Remote Sensing*, v. 7, p. 119- 136.
- 26- Lo Icano, C., and J. Guillen, 2008, Enviromental conditions for gravelly and pebbly dunes and sorted bedforms western Mediterranean, *Continental Shelf Research*, v. 28, p. 245- 256.
- 27- Lobo, F. J., F. J. Hernandez-Molina, L. Somoza, J. Rodero, A. Maldonado, and A. Barnolas, 2000, Patterns of bottom current flow deduced from dune asymmetries over the Gulf of Cadiz shelf (South west Spine): *Marine Geology*, v. 164, p. 91-117.
- 28- Muller, S., J. Lowag, 2001, Parametric sediment echo sounder SES-96 for dredging applications: Workshop of the hydrographic Society, Rotterdam, p. 1- 27.
- 29- Nichols, G., 2009, *Sedimentology and stratigraphy* (2nd ed.): Blackwell Science, 419p.
- 30- Pettijohn, F. J., P. E. Potter, and R. Siever, 1987, *Sand and sandstone* (2nd ed.): Springer-Verlag, New York, 553p.
- 31- Preusser, F., D. Raddies, and A. Matter, 2002, A 160000-year record of dune development and atmospheric circulation in Southern Arabia: *Science*, v. 296, p. 2018-2022.
- 32- Prothero, D. R., and F. Schwab, 2003, *Sedimentary geology: an introduction to sedimentary rocks and stratigraphy* (2nd ed.): W. H. Freeman and company, New York, 559p.
- 33- Southard, J. B., and A. Boguchwal, 1990, Bed configuration in steady unidirectional water flows; part 3, effects of temperature and gravity: *Journal of Sedimentary Petrology*, v. 60, p.680- 686.
- 34- Stampfli, G., J. Marcoue, and A. Baud, 1991, Tethian margins in space and time: *Paleogeography, Paleocology, Paleoclimate*, v. 87, p. 373- 409.
- 35- Stride, A. H., 1982, *Offshore Tidal sands: processes and deposits*: Chapman and Hall, London, 213p.
- 36- Ziegler, M. A., 2001, Late Permian to Holocene paleofacies evolution of the Arabian plate and its hydrocarbon occurrences: *GeoArabia*, v.6, p. 445- 504.
- 14- Boggs, J. R. Sam, 2001, *Principles of sedimentology and stratigraphy* (3rd edition): Prentice Hall, New Jersey, 770p.
- 15- Carling, P. A., 1999, Subaqueous gravel dunes: *Journal of Sedimentary Research*, v. 69, p. 534-545.
- 16- Cheel, R. j., 1990, Horizontal lamination and the sequence of bed phases and stratification under upper flow regime conditions: *Sedimentology*, v. 37, p. 517-530.
- 17- Cheel, R. J., 2005, *Introduction to clastic sedimentology: notes for a university level, second year*, Department of Earth Sciences Brock university, [http:// www.ca / sedimentology](http://www.ca/sedimentology).
- 18- Cirac, p., S. Berne, P. Castain and O. Weber, 2000, Processus demise place et devolution de la couverture sedimentair superficielle de la plate- Forme nord-Aquitaine. *Oceanologica Acta* 23, p. 663-686.
- 19- Costello, W. R., and J. B. Southard, 1981, Flume experiments on lower-flow regime bedforms in coarse sand: *Journal of Sedimentary Petrology*, v. 51, p. 849-864.
- 20- Devon, M. B., P. A. Carling, R. A. Bayer, N. Lancaster, 2004, Flood-formed dunes in Athabasca Valles, Mars: morphology, modeling and implications: *Icarus*, v. 171, p. 68-83.
- 21- Flemming, B. W., 2000, On the dimensional scaling of subaqueous dunes in response to changing flow condition: a conceptual process model. In: A. Trentesaux and T. Garlen (Eds.), *Marin sand wave dynamics*: Lille University Press, Lille, France, p. 61-67.
- 22- Folk, R. L., 1974, *Petrology of sedimentary rocks*: Hemphill publishing company, Austin, Texas, 184p.
- 23- Haq, B. U., J. Hardenbol, and P. R. Vail, 1988, Mesozoic and Cenozoic Chronostratigraphy and cycles of sea- level change. In: C.k. Wilgus, B.S. Hastings, C.G.St.C. Kendall, H. Posamentier, J. Van Wagoner, and C.A. Ross (Eds.), *Sea- level changes, an integrated approach*: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publication, v. 42, p. 71- 108.
- 24- Harris, P. T., and M. B. Collins, 1985, Bedform distributions and sediment transport paths in the Bristol channel and Severn Estuary, U. K., *Marine Geology*, v. 62, p. 153-166.