

## بایواستراتیگرافی، رخساره‌ها و چین‌نگاری سکانشی سازند سروک در میدان نفتی اهواز، شمال زون فروافتادگی دزفول

محمدحسن کاظم‌زاده، دانشجوی دکترای چین‌شناسی و فسیل‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران\*

مسعود لطف‌پور، دکترای چین‌شناسی و فسیل‌شناسی شرکت مشاوران انرژی تهران، ایران

### چکیده

مطالعات دیرینه‌شناسی به شناسایی ۲۱ جنس و ۱۶ گونه از فرامینیفرهای بتتیک، ۵ جنس و ۶ گونه از فرامینیفرهای پلانکتونیک و ۳ جنس و ۳ گونه از الیگوسترنییدها منجر گردید. توزیع و گسترش قائم فون‌های شناسایی شده به شناسایی ۵ بایوزون منجر شد که عبارتند از: *Favusella washitensis* Range Zone, *Oligostegina* Assemblage Zone, *Rudist debris* Zone, *Nezzazata-Alveolinids* Assemblage Zone, *Nezzazatinella-Dicyclina* Assemblage Zone بر اساس بایوزون‌های ارائه شده، سن سازند سروک در منطقه مورد مطالعه آلبین پسین تا تورونین پیشین است. ۱۱ رخساره کربناته متعلق به چهار محیط جزر و مدی، سدی، لاگون محصور و نیمه محصور و دریای باز شناسایی گردید که بر روی یک رمپ کربناته با شیب کم (Homoclinal ramp) ته‌نشست شده‌اند. براساس تغییرات عمودی رخساره‌ها و شناسایی محیط‌های رسوبی، چهار سکانش رسوبی رده سوم تشخیص داده شد. بسته‌های رسوبی پیشرونده (TST) عمدتاً از رخساره‌های دریای باز حاوی سوزن اسفنج، الیگوسترنیید، فرامینیفر بتتیک و اکتینوئید تشکیل شده‌اند در حالی که بسته‌های رسوبی وابسته به سکون و آغاز پسروری (HST) عمدتاً شامل رخساره‌های سدی غنی از بایوکلاست و رخساره‌های لاگون محصور و نیمه محصور غنی از فرامینیفرهای بتتیک با پوسته پورسلانوز و هیالین و پلوتید است. سطح حداکثر پیشروی آب دریا (MFS) توسط رخساره‌های دریای باز غنی از اکتینوئید و فرامینیفر پلانکتونیک مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها: بایواستراتیگرافی، رخساره، محیط دیرینه، چین‌نگاری سکانشی، سازند سروک، میدان نفتی اهواز

## مقدمه

سازند سروک به عنوان یکی از سازندهای گروه بنگستان به علت داشتن پتانسیل مخزنی هیدروکربوری، یکی از واحدهای سنگ چینه‌ای مهم در حوضه زاگرس محسوب می‌شود (Motiei 1993). برش نمونه سازند سروک در تنگ سروک در دامنه جنوبی تاکدیس کوه بنگستان قرار دارد (James & Wynd 1965). سنگ شناسی این سازند در برش نمونه شامل ۸۰۰ متر سنگ آهک است که مرز زیرین این سازند با سازند کژدمی پیوسته و تدریجی و مرز بالایی آن با سازند گورپی به صورت ناپیوستگی فرسایشی و توسط رسوبات لاتریتی مشخص می‌شود (Motiei 1993). سازند سروک در اکثر بخش‌های حوضه زاگرس عمدتاً از فرامینفرهای بتیک تشکیل شده است و این فرامینفرها در جهت تعیین سن رسوبات محیط‌های کم عمق با ارزش هستند (Wynd 1965). شناسایی فرامینفرهای بتیک و پلانکتونیک در محیط‌های کربناته ابزاری مفید برای بازسازی محیط رسوبی دیرینه است (Geel 2000; Romero et al. 2002; BouDagher-Fadel 2008; از جمله مطالعات انجام شده بر روی سازند سروک می‌توان به (Ghabeishavi et al. 2010; Rahimpour-Bonab et al. 2012; Asadi Mehmandosti et al. 2013; Esrafil-Dizaji et al. 2015) اشاره نمود. سازند سروک در منطقه مورد مطالعه سرشار از فرامینفرهای بتیک و پلانکتونیک است لذا با استفاده از محتوای فسیلی و مطالعات پتروگرافی می‌توان بایواستراتیگرافی، محیط دیرینه و چینه‌نگاری سکانشی این سازند را بررسی نمود.


## روش مطالعه و موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

چاه AZ 355 در بخش شمال غربی میدان نفتی اهواز قرار دارد که بخشی از کمربند چین خورده-رانده زاگرس محسوب می‌شود (Stocklin 1968). طول میدان نفتی اهواز حدود ۸۰ کیلومتر و عرض آن ۶٫۵ کیلومتر است که در شمال زون

فروافتادگی دزفول واقع شده است (شکل ۱). این میدان یک تاکدیس سینوسی کم شیب و متقارن با روند شمال غربی- جنوب شرقی است که به سمت جنوب غرب مرتفع‌تر می‌شود. سازند سروک در چاه AZ 355، ۸۱۰ متر ضخامت دارد. ۳۰۴ مقطع نازک از توالی کربناته سازند سروک تهیه و به منظور مطالعات دقیق پتروگرافی توسط حلال آلزارین قرمز، رنگ‌آمیزی شده است (Dickson 1965). مرز زیرین سازند سروک با سازند کژدمی در چاه مورد مطالعه پیوسته و تدریجی و مرز بالایی آن با ناپیوستگی فرسایشی در زیر شیل لافان قرار دارد. مطالعات بایواستراتیگرافی بر اساس (Wynd 1965) و توصیف و طبقه‌بندی رخساره‌ها بر اساس طبقه‌بندی (Dunham 1962) و با اصلاحاتی از (Embry & Klován 1972) صورت گرفته است. چینه‌نگاری سکانشی بر اساس اصول و مفاهیم چینه‌نگاری سکانشی (Sharl & et al. 2001; Simmons et al. 2007) است

## لیتواستراتیگرافی

سازند سروک در چاه AZ 355 در میدان نفتی اهواز واقع در شمال زون فروافتادگی دزفول شامل ۸۱۰ متر سنگ آهک‌های متوسط تا ضخیم لایه، سفید تا خاکستری و در برخی بخش‌ها حاوی ندول‌های چرت است. بخش‌های زیرین این سازند عمدتاً از آهک‌های شیلی تشکیل شده است و این آهک‌های شیلی با مرزی پیوسته و تدریجی بر روی شیل‌های سازند کژدمی قرار می‌گیرد. به سمت راس توالی سازند سروک در چاه مورد مطالعه از مقدار شیل کم شده و لیتولوژی اصلی سنگ آهک خالص می‌گردد. در بخش‌های بالایی، سنگ آهک‌های سازند سروک با مرزی ناپیوسته در زیر شیل لافان قرار می‌گیرد.



شکل ۱- موقعیت قرارگیری میدان نفتی اهواز در شمال زون فروافتادگی دزفول در حوضه زاگرس.

*Favusella washitensis* مشخص می‌گردد. سایر فرامینفرهای

شناسایی شده در این زون عبارتند از: *Rotalipora globotruncanoides*, *Rotalipora appenninica*, *Rotalipora* sp., *Muricohedbergella* sp., *Heterohelix moremani*, *Muricohedbergella delrioensis*, *Heterohelix* sp., *Macroglobigerinelloides* sp. فرامینفرهای شناسایی شده معادل با بایوزون شماره ۲۳ و ایند (Wynd 1965) است و سن آلبین پسین تا سنومانین پیشین را ارائه می‌دهد. لازم به ذکر است که اولین ظهور گونه *Rotalipora globotruncanoides* شروع اشکوب سنومانین را نشان می‌دهد (Premoli Silva & Verga 2004).

## بایوزون ۲: *Oligostegina* Assemblage Zone

این زون دارای ۹۶ متر ضخامت است و در حدفاصل اعماق ۴۲۲۴ تا ۴۱۲۸ متر شناسایی شد. این زون با فراوانی بسیار

## بایواستراتیگرافی

در مطالعات دیرینه‌شناسی و زیست چینه‌ای سازند سروک در چاه AZ 355، ۲۱ جنس و ۱۶ گونه از فرامینفرهای بتتیک، ۵ جنس و ۶ گونه از فرامینفرهای پلانکتونیک و ۳ جنس و ۳ گونه از الیگوسترنیدها شناسایی گردید. نمونه‌هایی از فرامینفرهای بتتیک و پلانکتونیک و الیگوسترنیدهای شناسایی شده در شکل‌های ۲ و ۳ نشان داده شده است. بر اساس فسیل‌های شناسایی شده و مقایسه آن‌ها با زون‌بندی (Wynd 1965) پنج بایوزون ارائه گردید که عبارتند از:

## بایوزون ۱: *Favusella washitensis* Range Zone

این زون به ضخامت ۹۶ متر در حدفاصل اعماق ۴۳۲۰ تا ۴۲۲۴ متر شناسایی شد و با اولین و آخرین ظهور گونه

*bingistani*, *Trocholina arabica*, *Psuedolithuonella reicheli*, *Ovalveolina* sp., *Textularia* sp., *Nummoloculina* sp., *Praechrysalidina* sp., miliolids and *textulariids* مانند *Rotalipora cushmani*, *Rotalipora* sp., *Muricohedbergella delrioensis*, *Muricohedbergella* sp., *Heterohelix moremani*, *Heterohelix* sp., *Macroglobigerinelloides* sp. نیز در این زون مشاهده شدند. فرامینفرهای بنتیک شناسایی شده معادل با بایوزون شماره ۲۵ وایند (Wynd 1965) است و سن سنومانین میانی تا پسین را ارائه می‌دهد. حضور گونه *Rotalipora cushmani* سن سنومانین میانی تا پسین را تأیید می‌کند (Premoli Silva & Verga 2004).

#### بایوزون ۵: *Nezzazatinella-Dicyclina* Assemblage Zone

آخرین بایوزون شناسایی شده ۱۵۳ متر ضخامت دارد و در حد فاصل اعماق ۳۶۶۳ تا ۳۵۱۰ متر شناسایی شده است. این بایوزون با فراوانی جنس‌های *Dicyclina* و *Nezzazatinella* ظهور گونه *Moncharmontia apenninica* مشخص می‌گردد. سایر فرامینفرهای بنتیک مانند *Ammobaculites* sp., *Spiroloculina* sp., *Textularia* sp., *Nummoloculina* sp., miliolids and *textulariids* و تعداد اندکی فرامینفرهای پلانکتونیک مانند *Muricohedbergella* sp., *Heterohelix* sp., *Macroglobigerinelloides* sp. نیز شناسایی شدند. فرامینفرهای بنتیک شناسایی شده معادل با بایوزون شماره ۲۹ وایند (Wynd 1965) است و سن تورونین پیشین برای آن در نظر گرفته شده است. به عقیده بسیاری از محققان ظهور و فراوانی گونه *Moncharmontia apenninica* تورونین است (De Castro 1966; Sartorio & Venturini 1988; Korbar & Husinec 2003). انقراض جنس‌های روتالپورا (*Rotalipora*) و نزازاتا (*Nezzazata*) در مرز زیرین این بایوزون، سن تورونین را تأیید می‌کند.


زیاد الیگوستژنیده‌ها مانند *Pithonella ovalis*, *Calcisphaerula innominate lata*, *Calcisphaerula innominata* مشخص می‌گردد. تعدادی فرامینفرهای پلانکتونیک مانند *Heterohelix moremani*, *Muricohedbergella* sp., *Heterohelix* sp., *Macroglobigerinelloides* sp. نیز در این زون یافت شدند. به طور کلی، گسترش زمانی این زون از آلبین پسین تا تورونین است (Motiei 1993). در منطقه مورد مطالعه، با توجه به قرارگیری این زون در بالای بایوزون شماره ۱ و در زیر بایوزون شماره ۳، سن سنومانین پیشین برای این بایوزون در نظر گرفته شد.


#### بایوزون ۳: *Rudist debris* Zone

این زون دارای ۱۰۳ متر ضخامت بوده و در حدفصل اعماق بین ۴۱۲۸ تا ۴۰۲۵ متر شناسایی گردید. خرده‌های رودیست فراوان‌ترین فون تشکیل‌دهنده این زون هستند. تعدادی فرامینفرهای بنتیک مانند *Textularia* sp., *Lenticulina* sp., miliolids نیز در این زون مشاهده شدند. گسترش زمانی این بایوزون نیز به مانند بایوزون شماره ۲ از آلبین پسین تا تورونین است (Motiei 1993). اما با توجه به قرارگیری این زون در بالای بایوزون شماره ۲ و در زیر بایوزون شماره ۴، سن سنومانین پیشین تا میانی برای این بایوزون ارائه شد.

#### بایوزون ۴: *Nezzazata-Alveolinids* Assemblage Zone

این زون با ضخامت ۳۶۲ متر در حدفصل اعماق ۴۰۲۵ تا ۳۶۶۳ متر شناسایی گردید. بایوزون شماره ۴ با گسترش و فراوانی جنس *Nezzazata* و خانواده Alveolinids مشخص می‌گردد. سایر فرامینفرهای بنتیک مانند *Nezzazata simplex*, *Nezzazata convex*, *Nezzazata gyra*, *Nezzazata concava*, *Praealveolina cretacea*, *Ovalveolina ovum*, *Cisalveolina fallax*, *Multispirina iranensis*, *Nezzazatinella picardi*, *Ammobaculites* sp., *Cuneolina pavonia*, *Dictyoconus* sp., *Orbitolina* sp., *Dicyclina schlumbergeri*, *Chrysalidina gradata*, *Taberina*






شکل ۳- الف) *Ovalveolina* sp. (ب) *Multispirina iranensis* (پ) *Chrysalidina gradata*. ت) 1: *Psuedolithuonella reicheli*, 2: *Pyrgo* sp. (ج) *Orbitolina* sp. (د) *Dicyclina schlumbergeri* (ذ) *Taberina bingistani* (ر) *Trocholina arabica* (ز) *Rotalipora* (س) *Nezzazatinella picardi* (ش) *Cuneolina pavonia* (ص) *Moncharmontia apenninica*

در نظر گرفته شد. توزیع و گسترش فون‌های شناسایی شده در شکل ۴ نشان داده شده است.

با توجه به بایوزون‌های ارائه شده، سن سازند سازند سروک در منطقه مورد مطالعه آلبین پسین تا تورونین پیشین



شکل ۴- توزیع و گسترش فونای شناسایی شده در سازند سروک در منطقه مورد مطالعه.

رخساره‌های شناسایی شده و ویژگی‌های اصلی آن‌ها شامل اجزای اصلی، اندازه، ساختارهای رسوبی، بافت و محیط رسوبی در شکل ۵ نشان داده شده است. تمام رخساره‌های شناسایی شده کربناته هستند به جز رخساره شماره ۲ که

#### رخساره‌ها


با توجه به اجزای اسکلتی اصلی و غیر اسکلتی، اندازه و بافت ۱۱ رخساره شناسایی گردید که در چهار محیط جزر و مدی، لاگون، سدی و دریای باز ته‌نشست شده‌اند. انواع

شامل ۵ تا ۲۰٪ کوارتزهای دانه‌ریز است. رخساره‌های مادستونی دارای ساختارهای فنستريت و دانه‌های تخریبی کوارتز مشخصه محیط جزر و مدی (Tidal flat) هستند (Ginsburg & Hardie 1975; Shinn 1983; Flugel 2010). در حدواسط محیط لاگون و جزر و مدی و در روند کم عمق‌شوندگی سطح آب دریا پدیده دولومیتی شدن و در بخش بالایی سازند سروک رخ داده است. رخساره‌های گل پشتیبان (Mud-supported) دارای فونای کم عمق مانند فرامینفرهای بتیک با پوسته پورسلانوز و آگلوتینه، جلبک سبز، گاستروپود و استراکود در محیط لاگون محصور (Restricted lagoon) به فراوانی یافت می‌شوند (Hottinger 1997; Geel 2000). ظهور مقداری از فونای دریای باز مانند اکیئوئید و بریوزوئر در بخش‌هایی از رخساره‌های لاگون بیانگر ارتباط این بخش‌ها با دریای باز بوده و لاگون نیمه محصور (Non-restricted lagoon) را نشان می‌دهد (Flugel 2010). زمینه اسپاریتی و دانه پشتیبان (Grain-supported) و آلوکم‌های جور شده و گرده شده نشان‌دهنده محیط سدی یا شول (Shoal) است (Flugel 2010). رخساره‌های دارای فرامینفرهای بتیک بزرگ، ایترکلاست، اکیئوئید و دو کفه‌ای

نشانگر ته نشست این رخساره‌ها در زیر سطح اساس امواج عادی (Fair weather wave base) بوده و در محیط دریای باز (Open marine) ته‌نشست شده‌اند. رخساره‌های با زمینه میکربیتی و دارای سوزن اسفنج، الیگوستژنید و فرامینفرهای پلانکتونیک شرایط کم انرژی در زیر سطح اساس امواج طوفانی (Storm wave base) هستند (Wilson 1975; Burchette 2010; Wright 1992; Flugel 2010). تصاویری از رخساره‌های شناسایی شده در شکل ۶ نشان داده شده است. رحیمی‌نژاد و همکاران (۱۳۸۵) در میدان نفتی گچساران ۷ رخساره، صفدری ادیمی و همکاران (۱۳۸۹) در زون فارس ۱۳ رخساره، غبیشاوی و همکاران (Ghabeishavi et al. 2010) در مطالعه سازند سروک در تاکدیس کوه بنگستان ۱۲ رخساره، رازین و همکاران (Razin et al. 2010) در تاکدیس کوه لندره (سکشن‌های بی بی سیدان و پادنا) ۱۵ رخساره، رحیم‌پور بناب و همکاران (Rahimpour-Bonab et al. 2012) در میدان نفتی آب تیمور ۱۲ رخساره و اسدی مهماندوستی و همکاران (Asadi mehmandosti et al. 2013) در زون ایزه ۱۰ رخساره را پیشنهاد نموده‌اند.

| Facies |                                          | Facies Descriptions                                                                                                                                                                 | Environment                            |             |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| F1     | Fenestral mudstone                       | Fine grained microcrystalline carbonate mud matrix; lack of bioclast and contain fenestrate structure; bioclast are restricted to rare ostracod; low energy; deposition above FWWB  | Tidal flat (coastal plain)             | Inner ramp  |
| F2     | Sandy mudstone                           | Silt to very fine-grained detrital quartz grains; bioclast are restricted to rare ostracod; several sub-facies can be recognized based on bioclast debris                           | Tidal flat (coastal plain)             |             |
| F3     | Medium to coarse crystalline dolostone   | Idiotopic medium to coarse crystalline dolomite; rare micrite; silt to very fine-grained detrital quartz grains; rare to common bioclast; rare small benthic foraminifera           | Tidal flat (shoreface)                 |             |
| F4     | Miliolid textulariid wackestone          | Abundant miliolids and textulariids; porcelaneous foraminifera present; recrystallized green algae; rare to common ostracods; rare echinoid debris; carbonate mud matrix            | Upper offshore (restricted lagoon)     |             |
| F5     | Bioclast benthic foraminifera packstone  | Abundant and diverse benthic foraminifera such as <i>Nezazata</i> , Orbitolinids and miliolids; mollusc debris; rare bryozoan debris; rare echinoid debris; carbonate mud matrix    | Upper offshore (non-restricted lagoon) | Middle ramp |
| F6     | Bioclast peloid grainstone               | Abundant peloid and intraclast; abundant porcelaneous foraminifera; rare hyaline foraminifera; rare to abundant echinoids; rare echinoid debris                                     | Upper offshore (shoal)                 |             |
| F7     | Rudist floatstone                        | Abundant rudist fragments; rare small benthic foraminifera; echinoid debris; rare to abundant mollusc debris; carbonate mud matrix                                                  | Upper offshore (shoal)                 |             |
| F8     | Bioclast orbitolinids packstone          | Abundant larger benthic foraminifera such as Orbitolinids, <i>Dicyclina</i> and <i>Chrysalidina</i> ; Bivalve debris; bryozoan debris; common echinoid debris; carbonate mud matrix | Upper offshore (below FWWB)            |             |
| F9     | Bioclast intraclast echinoid packstone   | Abundant echinoid debris and intraclast; mollusc debris; bryozoan debris; rare oligosteginids; rare to common peloids; carbonate mud matrix;                                        | Upper offshore (affected by storm)     | Outer ramp  |
| F10    | Sponge spicule oligosteginids wackestone | Abundant sponge spicules and oligosteginids; rare planktonic foraminifera; mollusc debris; bryozoan debris; common echinoid debris; carbonate mud matrix                            | Upper offshore (below SWB)             |             |
| F11    | Planktonic foraminifera packstone        | Abundant planktonic foraminifera such as <i>Muricohedbergella</i> and <i>Rotalipora</i> ; bryozoan debris; rare to common radiolaria; common echinoid debris; carbonate mud matrix  | Upper offshore (below SWB)             |             |

شکل ۵- انواع رخساره‌های شناسایی شده، ویژگی‌های اصلی و محیط رسوبی آنها



شکل ۶- F1) مادستون دارای ساختارهای فنستریت یا چشم چرنده ای، F2) مادستون دارای دانه های کوارتز، F3) دولوستون تشکیل شده از بلورهای متوسط تا بزرگ دولومیت، F4) وکستون دارای میلیولید و تکستولارید، F5) پکستون دارای فرامینیفر بتتیک و بایوکلاست، F6) د) گرینستون دارای بایوکلاست و پلوئید، F7) فلوتستون رودیستی، F8) پکستون دارای اریبتولینید و بایوکلاست، F9) پکستون دارای بایوکلاست، اکینوئید و اینتراکلاست، F10) وکستون دارای سوزن اسفنج و الیگوستنژنید، F11) پکستون دارای فرامینیفرهای پلانکتونیک، علائم اختصاری عبارتند از: Q: کوارتز؛ Do: بلسور دولومیت؛ Tex: تکستولارید؛ Mi: میلیولید؛ Or: اریبتولینید؛ Nez: نزازاتا؛ Pf: فرامینیفر پلانکتونیک؛ Bi: دوکفه ای؛ Ech: اکینوئید؛ Os: استراکود؛ Ru: رودیست؛ Spi: سوزن اسفنج؛ Ol: الیگوستنژنید؛ Pel: پلوئید؛ Int: اینتراکلاست.

### بازسازی محیط دیرینه

با بررسی روند تغییرات رخساره‌ها و توزیع فرامینفرهای بتتیک و پلانکتونیک و سایر فونا می‌توان محیط دیرینه تشکیل نهشته‌های کربناته سازند سروک را بازسازی نمود. بر اساس انواع رخساره‌های شناسایی شده، روند تغییرات تدریجی آن‌ها از بخش‌های عمیق تا کم عمق، فقدان رسوبات حاصل از جریان‌های توربیدیتی، رسوبات ریزشی و لغزشی، فقدان ریف‌ها، عدم حضور آنکوئیدها، پیزوئیدها و دانه‌های تجمعی که خاص شلف‌های کربناته هستند (Flugel 2010) می‌توان گفت سازند سروک در منطقه مورد مطالعه، بر روی یک رمپ کربناته با شیب کم (Homoclinal ramp) ته‌نشست شده است (Read 1985; Burchette & Wright 1992) (شکل ۷). وزیری مقدم و صفری (۱۳۸۲) در منطقه سمیرم، رحیمی نژاد و همکاران (۱۳۸۵) در میدان نفتی گچساران، طاهری و سرداکی (۱۳۹۰) در جنوب غرب بروجن و رحیم پور بناب و همکاران (Rahimpour-Bonab et al. 2012) در میدان نفتی آب تیمور یک مدل رسوب گذاری رمپ هموکلینال را برای سازند سروک پیشنهاد داده اند در حالی که صفدری ادیمی و همکاران (۱۳۸۹) در جنوب غرب فیروزآباد، رازین و همکاران (Razin et al. 2010) در تاق‌دیس کوه لندره و غیشاوی و همکاران (Ghabeishavi et al. 2010) در تاق‌دیس کوه بنگستان یک مدل رسوب گذاری شلف بدون لبه (Non-rimed shelf) را پیشنهاد کرده‌اند.

### رمپ خارجی (Outer ramp)

دو رخساره (F10 و F11) نشان‌دهنده محیط رمپ خارجی هستند و عمدتاً از فرامینفرهای پلانکتونیک (F11) و سوزن اسفنج و الیگوستژنید (F10) به همراه سایر فونای دریای باز مانند رادیولاریا، اکینوئید و بریوزوئر تشکیل شده‌اند (شکل ۷). فراوانی و گسترش زیاد فرامینفرهای پلانکتونیک، سوزن اسفنج و الیگوستژنید در زمینه میکرایتی و عدم حضور فونای محیط کم عمق مانند فرامینفرهای بتتیک بیانگر آن است که این رخساره‌ها در آب‌های آرام و کم انرژی رمپ خارجی در زیر سطح اساس امواج طوفانی (Storm wave base) با شوری نرمال دریایی ته‌نشست شده‌اند (Wilson 1975; Burchette & Wright 1992; Flugel 2010).

### رمپ میانی (Middle ramp)


دو رخساره (F8 و F9) بیانگر محیط رمپ میانی و عمدتاً از اکینوئید، ایتراکلاست، بریوزوئر، دوکفه‌ای و اندکی الیگوستژنید و پلوئید (F9) و فرامینفرهای بتتیک بزرگ مانند *Orbitolina*, *Dicyclina*, *Chrysalidina*, *Taberina*, *Cuneolina* (F8) تشکیل شده‌اند (شکل ۷). حضور گسترده قطعات اکینوئید و ایتراکلاست در رخساره F9 نشان می‌دهد که این رخساره در محیط دریای باز با انرژی کم تا متوسط ته‌نشست شده است (Heckel 1972; Harris et al. 1997; Flugel 2010). حضور الیگوستژنیدها در رخساره F9 نشان می‌دهد که این رخساره در بخش‌های عمیق تر رمپ میانی تشکیل شده است (Flugel 2010). حضور فرامینفرهای بتتیک بزرگ به همراه فونای دریای باز مانند اکینوئید، بریوزوئر و اندکی الیگوستژنید بیانگر آن است که رخساره F8 در محیط رمپ میانی زیر سطح اساس امواج عادی (Fair weather wave) (base) ته‌نشست شده است (Wilson 1975; Flugel 2010).

### رمپ داخلی (Inner ramp)

هفت رخساره (F1 تا F7) محیط رمپ داخلی را نشان می‌دهند (شکل ۷). رخساره‌های F6 و F7 در محیط پر انرژی سدی بالای سطح اساس امواج عادی (FWWB) تشکیل شده‌اند. رخساره F7 عمدتاً شامل قطعات بزرگ رودیست بوده که در محیط پر انرژی تشکیل شده اما بر اثر انرژی امواج قطعات رودیست جابجا شده و در آب‌های کم انرژی تر محیط سدی به سمت دریای باز ته‌نشین شده‌اند (Flugel 2010). رخساره F6 از پلوئید و ایتراکلاست در زمینه دانه پشتیبان (Grain-supported) و زمینه سیمان اسپاریتی تشکیل شده و محیط پر انرژی سدی را نشان می‌دهد (Flugel 2010). رخساره‌های لاگون شامل دو رخساره F4 و F5 بوده و عمدتاً از فرامینفرهای بتتیک با پوسته‌های پورسلانوز و آگلوتینه مانند *Orbitolina*, *Nezzazata*, *Nezzazatinella*, *alveolinids*, *amiliolids*, *textulariids*، دو کفه‌ای، پلوئید و جلبک سبز تشکیل شده‌اند. حضور گسترده فرامینفرهای بتتیک با پوسته پورسلانوز و عدم حضور فونای دریای باز، بیانگر محیط کم انرژی لاگون است (Hottinger 1997; Geel 2000). رخساره F3 از بلورهای دانه متوسط تا درشت دولومیت تشکیل شده و

در حدفاصل محیط لاگون و جزر و مدی تشکیل شده‌اند (Mutti and Simo 1994) (شکل ۸).


بیانگر فرایند دولومیت‌زایی در مراحل آخر دیاژنز است (Warren 2000) که در روند کم عمق شوندگی سطح آب دریا



شکل ۷- فرایند دولومیت‌زایی در روند کم عمق شوندگی سطح آب دریا در حدفاصل محیط لاگون تا جزر و مدی، علامت اختصاری عبارت است از: Do: بلور دولومیت.

زمینه میکرایتی است. این ساختارها به دلیل فرار حباب‌های هوا در طول غرق شدگی میکرایت‌ها در محیط جزر مدی تشکیل شده‌اند (Ginsburg & Hardie 1975; Shinn 1983; Adabi et al. 2010). توزیع و گسترش فرامینفرهای بتتیک و پلانکتونیک و سایر فونا مانند الیگوسترنید، رودیست، اکتینوئید، جلبک و دو کفه‌ای بر روی مدل رسوبی ارائه شده در شکل ۸ نشان داده شده است.

رخساره‌های F1 و F2 نشان‌دهنده محیط جزر و مدی هستند. رخساره F2 دارای زمینه میکرایتی بوده و حاوی ۵ تا ۲۰٪ ذرات کوارتز دانه‌ریز است که این ذرات از فرسایش لایه‌های قدیمی‌تر منشأ گرفته و احتمالاً به وسیله باد یا جریان‌های آبی از خارج حوضه به محیط دریایی جابجا شده‌اند (Tucker & Wright 1990; Flugel 2010). رخساره F1 حاوی ساختارهای چشم پرنده‌ای (Fenestrate structure) در



شکل ۸- مدل رسوبی ارائه شده و گسترش انواع فونا در سازند سروک در منطقه مورد مطالعه.

## چینه‌نگاری سکاسی

با بررسی تغییرات عمودی رخساره‌ها و شناسایی محیط‌های رسوبی می‌توان نهشته موجود در یک حوضه رسوبی را به سکانس‌های رسوبی تفکیک نمود (Emery & Myers 1996). سکانس رسوبی یک واحد چینه‌شناسی است که توسط ناپیوستگی‌ها یا پیوستگی‌های هم‌ارز از طبقات بالا و پایین تفکیک می‌گردد و دوره‌ای از رسوب‌گذاری را نشان می‌دهد که بین دو برهه زمانی افت سطح آب دریا اتفاق افتاده است (Vali et al. 1977; Van Wagoner et al. 1990). چینه‌نگاری سکاسی رسوبات مورد مطالعه به شناسایی ۴ سکانس رسوبی رده سوم منجر شده است. صفدری ادیمی و همکاران (۱۳۸۹) در جنوب غرب فیروزآباد، طاهری و سرداکی (۱۳۹۰) در جنوب غرب بروجن و رحیم‌پوربناب و همکاران (Rahimpour-Bonab et al. 2012) در میدان نفتی آب تیمور ۳ سکاسی رسوبی شناسایی کرده‌اند اما رازین و همکاران (Razin et al. 2010) در تاق‌دیس کوه لندره ۴ سکانس رسوبی ارائه کرده‌اند. سکانس‌های شناسایی شده در این مطالعه همخوانی مناسبی با سکانس‌های ارائه شده توسط رازین و همکاران (Razin et al. 2010) دارد و به خوبی قابل تطابق با سکانس‌های ارائه شده برای صفحه عربی (Sharland et al. 2001; Simmons et al. 2007) است (شکل ۹). سکانس‌های شناسایی شده عبارتند از:

### سکانس ۱

این سکانس با سن آلبین-پسین-سنومانین پیشین ۳۵۳ متر ضخامت دارد و در بخش زیرین تا میانی سازند سروک شناسایی گردید. مرز سازندهای کژدمی و سروک توسط رخساره غنی از اکتینوئید و ایتراکلاست (F9) مشخص می‌گردد و با توجه به قرارگیری این رخساره به عنوان یک رخساره کم‌عمق‌تر بین شیل‌های حاوی فرامینفرهای پلانکتونیک در بخش راسی سازند کژدمی و آهک‌های حاوی فرامینفرهای پلانکتونیک در بخش قاعده‌ای سازند سروک، به

عنوان مرز سکاسی در نظر گرفته شده و به دلیل عدم وجود شواهد خروج از آب، مرز سکاسی نوع دوم (Type 2 sequence boundary) است. بسته رسوبی پیشرونده سطح آب دریا (Transgressive system tract) عمدتاً از رخساره‌های رمپ میانی و خارجی تشکیل شده و حداکثر پیشروی سطح آب دریا (Maximum flooding surface) توسط رخساره رمپ خارجی غنی از فرامینفرهای پلانکتونیک (F11) مشخص می‌گردد. سطح MFS سکانس ۱ از لحاظ سنی قابل تطابق با MFS-K110 در صفحه عربی است (Sharland et al. 2001). بسته رسوبی وابسته به سکون و آغاز پسروی دریا (Highstand system tract) بیانگر روند تغییر تدریجی رخساره‌های رمپ خارجی غنی از الیگوستژنید و سوزن اسفنج (F10) به رخساره سدی غنی از قطعات رودیست (F7) و سپس رخساره‌های لاگون است. مرز بالایی این سکانس توسط رخساره لاگونی غنی از میلیولید و تکستولارید (F4) مشخص می‌شود و به دلیل عدم وجود شواهد خروج از آب، مرز سکاسی نوع دوم (SB2) است.

### سکانس ۲

این سکانس به ضخامت ۵۷ متر و با سن سنومانین میانی در بخش میانی سازند سروک شناسایی شد. بسته رسوبی پیشرونده سطح آب دریا (TST) پیشروی سریع سطح آب دریا را نشان می‌دهد و عمدتاً شامل رخساره‌های رمپ میانی و سدی است. سطح حداکثر پیشروی سطح آب دریا (MFS) توسط رخساره پکستون غنی از اکتینوئید و ایتراکلاست (F9) مشخص می‌گردد و از لحاظ سنی قابل تطابق با MFS-K120 در صفحه عربی است (Sharland et al. 2001). بسته رسوبی وابسته به سکون و آغاز پسروی سطح آب دریا (HST) تجمعی از رخساره‌های لاگون غنی از فرامینفرهای بتیک با پوسته پورسلانوز و آگلوتینه مانند *Nezzazata*, *Nezzazatinella*, *alveolinids*, *miliolids*, *textulariids* را نشان می‌دهد. رخساره مادستون دارای ذرات کوارتز (F2) مرز

بالایی این سکانس با سکانس سوم را مشخص می‌کند و مرز سکansı نوع دوم (SB2) است.

### سکانس ۳


این سکانس به ضخامت ۲۴۷ متر در برگرنده بخش میانی تا بالایی سازند سروک بوده و دارای سن سنومانین میانی تا پسین است. بسته رسوبی پیشرونده سطح آب دریا (TST) عمدتاً از رخساره رمپ میانی غنی از فرامینفرهای بتیک بزرگ مانند *Orbitolina*, *Chrysalidina*, *Cuneolina*, *Dicyclina*, *Taberina* و اکیونئید فراوان و ایتراکلاست تشکیل شده است. رخساره رمپ خارجی غنی از فرامینفرهای پلانکتونیک (F11)، سطح حداکثر پیشروی سطح آب دریا (MFS) را نشان می‌دهد و از لحاظ سنی قابل تطابق با MFS-K130 در صفحه عربی است (Sharland et al. 2001). بسته رسوبی وابسته به سکون و آغاز پسروی سطح آب دریا (HST) افت سریع سطح آب دریا را از رخساره رمپ میانی به رخساره سدی و سپس رخساره جزر و مدی نشان می‌دهد. مرز بین سکانس‌های سوم و چهارم توسط رخساره آهکی - تخریبی (F2) مربوط به محیط جزر و مدی مشخص می‌گردد و به دلیل عدم وجود شواهد خروج از آب و فرسایش رسوبات، مرز سکansı نوع دوم (SB2) در نظر گرفته شد.

### سکانس ۴

آخرین سکانس شناسایی شده با سن تورونین زیرین ۱۵۳ متر ضخامت دارد و در بخش بالایی سازند سروک شناسایی گردید. بسته رسوبی پیشرونده سطح آب دریا (TST) پیشروی جزئی سطح آب دریا را نشان می‌دهد و شامل رخساره‌های لاگون (F4) و سدی (F6) است. رخساره محیط سدی غنی از

ایتراکلاست و پلوئید سطح حداکثر پیشروی سطح آب دریا (MFS) را نشان می‌دهد و از لحاظ سنی قابل تطابق با MFS-K140 در صفحه عربی است (Sharland et al. 2001). بسته رسوبی وابسته به سکون و آغاز پسروی سطح آب دریا (HST) تجمعی از رخساره‌های لاگون و جزر و مدی را نشان می‌دهد. فرایند دولومیتی شدن در بالاترین بخش این سکانس در روند کم عمق شوندگی سطح آب دریا رخ داده است (Mutti & Simo 1994). مرز بالایی این سکانس بین سازند سروک و شیل لافان قرار گرفته است و به دلیل شواهد خروج از آب و فرسایش گسترده رسوبات، مرز سکansı نوع اول (Type 1 sequence boundary) است (Vail et al. 1984).

همچنین بر اساس تغییرات عمودی رخساره‌ها و سکانس‌های شناسایی شده، روند تغییرات سطح آب دریا در زمان تهنشست رسوبات سازند سروک، بازسازی و با منحنی تغییرات سطح آب صفحه عربی (Haq & Al-Qahtani 2005) مقایسه گردیده است (شکل ۹). مقایسه منحنی سطح آب دریا در این مطالعه با منحنی تغییرات سطح آب صفحه عربی در بازه زمانی آلین پسین تا تورونین زیرین نشان می‌دهد روند تغییرات سطح آب دریا در زمان تهنشست رسوبات سازند سروک در منطقه مورد مطالعه به وضوح تحت تأثیر روند تغییرات سطح آب صفحه عربی بوده است بدین ترتیب که از آلین پسین تا سنومانین پیشین به تدریج رو به کاهش بوده است. از شروع سنومانین میانی تا انتهای سنومانین همزمان با حادثه بی‌هوای اقیانوسی 2 OAE رو به افزایش رفته است (Friedrich et al. 2006; Bak 2007). پیش روی جزئی سطح آب دریا در تورونین زیرین با پس روی چشمگیری ادامه یافته و رسوبات کم عمق شیل لافان تهنشست شده است.



شکل ۹- گسترش و پراکندگی رخساره‌ها، سکانس‌های رسوبی ارائه شده و روند تغییرات سطح آب دریا.

## نتیجه

بر اساس فونای شناسائی شده، ۵ بایوزون ارائه گردید که بیانگر سن آلبین پسین تا تورونین پیشین برای سازند سروک در منطقه مورد مطالعه است. مطالعات پتروگرافی به شناسائی ۱۱ رخساره کربناته منجر گردید که در چهار محیط جزر و مدی، سدی، لاگون و دریای باز ته‌نشست شده‌اند. روند تغییرات تدریجی رخساره‌ها، فقدان رسوبات حاصل از جریان‌های توریدایتی، رسوبات ریزشی و لغزشی، فقدان ریف‌ها، آنکوئیدها و پیژوئیدها نشانگر آن است که رسوب‌گذاری سازند سروک بر روی رمپ کربناته با شیب کم (Homoclinal ramp) رخ داده است. بررسی رخساره‌ها به شناسایی ۴ سکانس رسوبی رده سوم معادل با سکانس‌های K110, K120, K130, K140 در صفحه عربی و ۵ مرز سکانسی منجر گردید. سکانس‌های اول و سوم عمدتاً از رخساره‌های دریای باز و سدی تشکیل شده‌اند در حالی که سکانس‌های دوم و چهارم عمدتاً شامل رخساره‌های لاگون محصور و نیمه محصور و اندکی جزر و مدی هستند. مرز سکانسی اول بین سازندهای کژدمی و سروک واقع شده و به دلیل عدم وجود شواهد خروج از آب، مرز سکانسی نوع دوم (SB2) است. مرزهای سکانسی دوم تا چهارم در سازند سروک قرار گرفته و مرز سکانسی نوع دوم (SB2) هستند. آخرین مرز سکانسی بین سازند سروک و شیل لافان قرار دارد و به دلیل شواهد خروج از آب و فرسایش گسترده رسوبات، مرز سکانسی نوع اول (SB1) است. همچنین روند تغییرات سطح آب دریا با استفاده از تغییرات عمودی رخساره‌ها و سکانس‌های شناسایی شده بازسازی و با روند تغییرات سطح آب صفحه عربی مقایسه گردیده است. این مقایسه نشان می‌دهد روند تغییرات سطح آب دریا در زمان ته‌نشست رسوبات سازند سروک در منطقه مورد مطالعه از روند تغییرات سطح آب صفحه عربی پیروی نموده است.

## منابع

- رحیمی‌نژاد، ا.ح.، ح. وزیری مقدم، ع. صیرفیان، ا. صفری، ح. امیری بختیار، ۱۳۸۵، بایواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند سروک در میدان نفتی گچساران (چاه شماره ۵۵): مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان، ش. ۱، ص. ۸۷-۱۰۴.
- صفدری ادیمی، ح.، ح. وزیری مقدم، ع. صیرفیان، ع. غبیشاوی، و ع. طاهری، ۱۳۸۹، چینه‌نگاری سکانسی و میکروفاسیس سازند سروک در جنوب غرب فیروزآباد: مجله رخساره‌های رسوبی، ش. ۳ (۱)، ص. ۶۰-۴۸.
- طاهری، ع.، و ح. سرداقتی، ۱۳۹۰، میکروفاسیس و چینه‌نگاری سکانسی سازند سروک در جنوب غرب بروجن: مجله پژوهش‌های چینه‌نگاری و رسوب‌شناسی، ش. ۴۲، ص. ۴۰-۲۷.
- وزیری مقدم، ح.، و ا. صفری، ۱۳۸۲، بررسی رخساره‌های آهکی و تفسیر محیط رسوب‌گذاری سازند سروک در ناحیه سمیرم: مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان، ش. ۲، ص. ۷۴-۵۹.
- Adabi, M. H., M. A. Salehi, and A. Ghabeishavi, 2010, Depositional environment, sequence stratigraphy and geochemistry of Lower Cretaceous carbonates (Fahliyan Formation), south-west Iran: *Journal of Asian Earth Sciences*, v. 39, p. 148-160
- Asadi Mehmandosti, E., M. H. Adabi, and A. D. Woods, 2013, Microfacies and geochemistry of the Middle Cretaceous Sarvak Formation in Zagros Basin, Izeh Zone, SW Iran: *Sedimentary Geology Journal*, v. 293, p. 9-20
- Bak, K., 2007, Deep-water facies succession around the Cenomanian-Turonian boundary in the Outer Carpatian basin: Sedimentary, biotic and chemical records in the Silesian Nappe, Poland: *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, v. 248, p. 255-290
- BouDagher-Fadel, M. K., 2008, Evolution and Geological Significance of Larger Benthic Foraminifera: Developments in Palaeontology and Stratigraphy, Elsevier, 540 p

- Harris, M. K., A. A. Thayer, and M. A. Amidon, 1997, Sedimentology and depositional environments of Middle Eocene terrigenous-carbonate strata, southeastern Atlantic coastal plain: *Sedimentary Geology*, v. 108, p. 141-161
- Heckel, P. H., 1972, Recognition of ancient shallow marine environments. In: J. K. Rigby, and W. K. Hamblin, (Eds.), *Recognition of ancient sedimentary environments*: SEPM Special Publication, v. 16, p. 226-286
- Hottinger, L., 1997, Shallow benthonic foraminiferal assemblages as signals for depth of their deposition and their limitations: *Bulletin de la Societe Geologique de France*, v. 168, p. 491-505
- James, G. A., and J. G. Wynd, 1965, Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area: *American Association of Petroleum Geologists Bulletin*, v. 49, p. 2182-2245
- Korbar, T., and A. Husinec, 2003, Biostratigraphy of Turonian to (?) Coniacian platform carbonates: a case study from the island of Cres (northern Adriatic, Croatia): *Geologia Croatica*, v. 56, p. 173-185
- Motiei, H., 1993, *Stratigraphy of Zagros: Geological Survey of Iran Publication*, 536 p (in Persian)
- Mutti, M., and J. A. Simo, 1994, Distribution, petrography and geochemistry of dolomite in cyclic shelf facies, Yates formation (Guadalupean), Capitan Reef Complex, USA: *International Association Sedimentologists Special Publications*, v. 21, p. 91-107
- Premoli Silva, I., and D. Verga, 2004, Practical manual of Cretaceous planktonic Foraminifera: International school on planktonic Foraminifera, 3 courses: Cretaceous, In: D. Verga, and R. Rettori, (Eds.): *Universities of Perugia and Milan, Tipografia Pontefelcino, Perugia (Italy)*, 283 p
- Razin, P., F. Taati, and F.S.P. Van Buchem, 2010, Sequence stratigraphy of Cenomanian–Turonian carbonate platform margins (Sarvak Formation) in the High Zagros, SW Iran: an outcrop reference model for the Arabian Plate: *Geological Society, London*, v. 329, p. 187-218
- Rahimpour-Bonab, H., H. Mehrabi, A. H. Enayati-Bidgoli, and M. Omidvar, 2012, Coupled imprints of tropical climate and recurring emergence on evolution of a mid-Cretaceous carbonate ramp, Zagros Basin, SW Iran: *Cretaceous Research*, v. 37, p. 15-34
- Burchette, T. P., and V. P. Wright, 1992, Carbonate ramp depositional systems: *Sedimentary Geology*, v. 79, p. 3-57
- De Castro, P., 1966, Sulla prezenza di un nuovo genere di Endothyrida en el Cretacico superior della Campania: *Bolletino della Società dei Naturalisti in Napoli*, v. 75, p. 3-33
- Dickson, J., 1965, Carbonate identification and genesis as revealed by staining: *Journal of Sedimentary Petrology*, v. 205, p. 491-505
- Dunham, R. J., 1962, Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: W. E. Ham, (Eds.), *Classification of Carbonate Rocks: American Association of Petroleum Geologists Memoir*, v. 1, p. 108-121
- Embry, A. F., and J.E. Klován, 1972, Absolute water depths limits of Late Devonian paleoecological zones: *Geologische Rundschau*, v. 61, p. 672-686
- Emery, D., and K. J. Myers, 1996, *Sequence Stratigraphy*: Oxford, United Kingdom, Blackwell, 297 p
- Esrafil-Dizaji, B., H. Rahimpour-Bonab, H. Mehrabi, S. Afshin, F. Kiani Harchegani, and N. Shahverdi, 2015, Characterization of rudist-dominated units as potential reservoirs in the middle Cretaceous Sarvak Formation, SW Iran: *Facies*, v. 61, 14 p
- Flügel, E., 2010, *Microfacies of Carbonate Rocks, Analysis, Interpretation and Application*: Springer, 976 p
- Friedrich, O., J., Erbacher, and J., Mutterlose, 2006, Paleoenvironmental changes across the Cenomanian/Turonian Boundary Event (Oceanic Anoxic Event 2) as indicated by benthic foraminifera from the Demerara Rise (ODP Leg 207): *Revue de Micropaléontologie*, v. 49, p. 121-139
- Geel, T., 2000, Recognition of stratigraphic sequences in carbonate platform and slope deposits, Empirical models based on microfacies analysis of paleogene deposits in southeastern Spain: *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, v. 155, p. 211–238
- Ghabeishavi, A., H. Vaziri-Moghaddam, A. Taheri, and F. Taati, 2010, Microfacies and depositional environment of the Cenomanian of the Bangestan anticline, SW Iran: *Journal of Asian Earth Sciences*, v. 37, p. 275-285
- Ginsburg, R. N., and L. A. Hardie, 1975, Tidal and storm deposits Northwestern Andros Island, Bahamas. In: R.N. Ginsburg, (Eds.), *Tidal Deposits*, v. 23, p. 201-208
- Haq, B. U., and A. M. Al-Qahtani, 2005, Phanerozoic cycles of sea-level change on the Arabian Platform: *Geo Arabia*, v. 10, p. 127-160

- Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 7, p. 1-55
- Warren, J., 2000, Dolomite: occurrence, evolution and economically important association: Earth Science Reviews, v. 52, p. 1-81
- Wilson, J.L., 1975, Carbonate Facies in Geologic History: Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 471 p
- Wynd, J., 1965, Biofacies of Iranian Oil Consortium Agreement Area: IOOC Report, No. 1082 (unpublished)
- Read, J., 1985, Carbonate platform facies models: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 69, p. 1-21
- Romero, J., E. Caus, and J. Rossel, 2002, A model for the palaeoenvironmental distribution of larger foraminifera based on Late Middle Eocene deposits on the margin of the south Pyrenean basin (SE Spain): Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 179, p. 43-56
- Sartorio, D., and S. Venturini, 1988, Southern Tethys Biofacies: Agip S.P.A., S. Donato, Milan, 235 p
- Sharland, P. R., R. archer, D. M. Casey, R. B. Davis, S. H. Hall, A. P. Heward, A. D. Horbury, and M. D. Simmons, 2001, Arabian Plate sequence stratigraphy: Geo Arabia Special Publication 2, Gulf Petroleum Link, Bahrain, 371 p
- Shinn, G., 1983, Tidal flat environment. In: P. A. Scholle, D. G. Bebout, C. H. Moore, (Eds.), Carbonate Depositional Environments: American Association of Petroleum Geologists Memoir, v. 33, p. 171-210
- Simmons, M. D., P.R. Sharland, D. M. Casey, R. B. Davies, O. E. Sutcliffe, 2007, Arabian Plate sequence Stratigraphy: Potential implication for global chronostratigraphy, Geo Arabia, v. 12 (4), p. 101-130
- Stocklin, J., 1968, Structural history and tectonics of Iran: a review. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 52, p. 1229-1258
- Tucker, M. E., and V. P. Wright, 1990, Carbonate sedimentology: Blackwell Scientific Publications, 482 p
- Vail, P. R., R. M. Mitchum, and S. Thompson, 1977, Seismic stratigraphy and global changes of sea level, part 4: Global cycles of relative changes of sea level: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 26, p. 83-97
- Vail, P. R., J. Hardenbol, and R. G. Todd, 1984, Jurassic unconformities, chronostratigraphy and sea-level changes from seismic stratigraphy and biostratigraphy. In: J.S. Schlee, (Eds.), Interregional unconformities and hydrocarbon accumulation: American Association of Petroleum Geologists Memoir, v. 36, p. 129-144
- Van Wagoner, J. C., R. M. Mitchum, K. M. Campion, and V. D. Rahmanian, 1990, Siliciclastic sequence stratigraphy in well log, cores, and outcrops: Concepts of high-resolution correlation of time and facies: American

